

## Bipacksedel: Information till patienten

### Saxenda 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna liraglutid

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Saxenda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Saxenda
3. Hur du använder Saxenda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Saxenda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Saxenda är och vad det används för**

##### **Vad Saxenda är**

Saxenda är ett läkemedel för viktkontroll som innehåller den aktiva substansen liraglutid. Den liknar ett naturligt förekommande hormon som kallas GLP-1 som frigörs från tarmen efter en måltid. Saxenda fungerar genom att verka på receptorer i hjärnan som kontrollerar din aptit, som leder till att du känner dig mättare och mindre hungrig. Det kan hjälpa dig att äta mindre och att minska din kroppsvikt.

##### **Vad Saxenda används för**

Saxenda används för viktminskning i kombination med anpassad kost och motion hos vuxna 18 år och äldre som har

- ett BMI på 30 eller högre (fetma) eller
- ett BMI på 27 eller mindre än 30 (övervikt) och viktrelaterade hälsoproblem (till exempel diabetes, högt blodtryck, onormala nivåer av fetter i blodet eller andningsproblem under sömnen som kallas "obstruktiv sömnapné").

BMI (Body Mass Index) är ett mått på din vikt i förhållande till din längd.

Du ska bara fortsätta att använda Saxenda om du har gått ner minst 5% av din initiala kroppsvikt efter 12 veckor med doseringen 3,0 mg/dag (se avsnitt 3). Rådfråga läkare innan du fortsätter.

##### **Kost och motion**

Din läkare kommer att sammanställa ett kost- och motionsprogram åt dig. Följ detta program medan du använder Saxenda.

## **2. Vad du behöver veta innan du använder Saxenda**

### **Använd inte Saxenda:**

- om du är allergisk mot liraglutid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Saxenda.

Det finns liten eller ingen erfarenhet av detta läkemedel till patienter med hjärtsvikt. Det rekommenderas inte om du har svår hjärtsvikt.

Det finns liten erfarenhet av detta läkemedel hos patienter  $\geq 75$  år. Det rekommenderas inte om du är 75 år eller äldre.

Det finns liten erfarenhet av detta läkemedel till patienter med njurproblem. Om du har njursjukdom eller går på dialys, rådfråga läkare.

Det finns liten erfarenhet av detta läkemedel till patienter med leverproblem. Om du har problem med levern, rådfråga läkare.

Detta läkemedel rekommenderas inte om du har allvarliga mag- eller tarmproblem som ger långsam magsäckstömning (s k gastropares) eller om du har en inflammatorisk tarmsjukdom.

### Personer med diabetes

Om du har diabetes ska du inte använda Saxenda som ersättning för insulin.

### Inflammation i bukspottkörteln

Tala med läkare om du har eller har haft en sjukdom i bukspottkörteln.

### Inflammerad gallblåsa och gallstenar

Om du går ner mycket i vikt finns det risk för att det bildas gallstenar och att din gallblåsa blir inflammerad. Sluta ta Saxenda och kontakta läkare omedelbart om du får svår smärta i övre delen av buken, vanligtvis värst på höger sida under revbenen. Smärtan kan kännas ut mot ryggen eller höger skuldra. Se avsnitt 4.

### Sköldkörtelsjukdom

Om du har sköldkörtelsjukdom med sköldkörtelknutor och förstoring av sköldkörteln, rådfråga läkare.

### Hjärtfrekvens

Vänd dig till läkare om du under behandlingen med Saxenda får hjärtklappning (du känner ditt hjärta slå extra slag eller slå hårt) eller om det känns som om ditt hjärta rusar medan du vilar .

### Vätskeförlust och uttorkning

När du börjar behandlingen med Saxenda kan du förlora kroppsvätska och bli uttorkad. Detta kan hända om du blir illamående, kräks eller får diarré. Det är viktigt att undvika uttorkning genom att dricka tillräckligt mycket vätska. Vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har frågor eller funderingar. Se avsnitt 4.

### **Barn och ungdomar**

Saxenda ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år. Effekterna av detta läkemedel har inte studerats för denna åldersgrupp.

### **Andra läkemedel och Saxenda**

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om:

- du tar ett läkemedel mot diabetes som kallas "sulfonureid" (till exempel glimepirid eller glibenklamid), då du kan få lågt blodsocker (hypoglykemi) när du använder dessa läkemedel samtidigt med Saxenda. Din läkare kan eventuellt justera dosen av ditt diabetesläkemedel för att förhindra att du får lågt blodsocker. Se avsnitt 4 för information om varningssignaler för lågt blodsocker.
- du tar warfarin eller andra läkemedel genom munnen som minskar blodets koagulering (antikoagulant). Det kan krävas att du gör tätare kontroller av ditt blods levringsförmåga.

### **Graviditet och amning**

Använd inte Saxenda om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Det är inte känt om Saxenda påverkar barnet under graviditeten.

Du ska inte amma om du använder Saxenda. Det är inte känt om Saxenda passerar över till bröstmjolk.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Det är osannolikt att Saxenda påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Om du vill ha mer information, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

### **Viktig information om några innehållsämnen i Saxenda**

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos. Detta innebär att det är näst intill "natriumfritt".

## **3. Hur du använder Saxenda**

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Din läkare kommer att sammanställa ett kost- och motionsprogram åt dig. Följ detta program medan du använder Saxenda.

### **Hur mycket ska injiceras**

Din behandling kommer att starta med en låg dos som gradvis kommer att ökas under de första fem veckorna av behandlingen.

- När du börjar använda Saxenda är startdosen är 0,6 mg en gång dagligen, i minst en vecka.
- Du bör öka dosen med 0,6 mg varje vecka tills du når den rekommenderade dosen på 3,0 mg en gång dagligen.

Din läkare kommer att tala om hur mycket Saxenda du ska ta varje vecka. Du kommer förmodligen att följa nedanstående tabell.

Vecka	Injicerad dos
Vecka 1	0,6 mg en gång dagligen
Vecka 2	1,2 mg en gång dagligen
Vecka 3	1,8 mg en gång dagligen
Vecka 4	2,4 mg en gång dagligen
Vecka 5 och framåt	3,0 mg en gång dagligen

När du har nått den rekommenderade dosen på 3,0 mg i vecka 5 av behandlingen ska du fortsätta med denna dos tills behandlingsperioden är slut. Öka inte din dos ytterligare.

Din läkare kommer regelbundet att utvärdera din behandling.

#### **Hur och när du ska använda Saxenda**

- Innan du använder injektionspennan för första gången visar en läkare eller sjuksköterska hur du använder injektionspennan.
- Du kan ta Saxenda när som helst under dagen, med eller utan mat och dryck.
- Ta Saxenda vid ungefär samma tid varje dag – välj den tidpunkt på dagen som passar dig bäst.

#### **Var du ska injicera**

Saxenda ges som en injektion under huden (subkutan injektion).

- De bästa ställen att injicera på är framsidan av midjan (buken), framsidan av låren eller överarmarna.
- Injicera inte direkt i ett blodkärl eller en muskel.

På baksidan av den här bipacksedeln finns en utförlig bruksanvisning.

#### **Personer med diabetes**

Tala om för din läkare om du har diabetes. Din läkare kan eventuellt justera dosen av dina diabetesläkemedel för att förhindra att du får lågt blodsocker.

- Blanda inte Saxenda med andra läkemedel som du injicerar (t ex insuliner).
- Använd inte Saxenda tillsammans med andra läkemedel som innehåller GLP-1receptoragonister (till exempel exenatid och lixisenatid).

#### **Om du använt för stor mängd av Saxenda**

Kontakta läkare eller åk till ett sjukhus omedelbart om du använt för stor mängd av Saxenda. Ta med dig läkemedelsförpackningen. Du kan behöva läkarvård. Följande biverkningar kan inträffa:

- illamående
- kräkningar.

#### **Om du har glömt att använda Saxenda**

- Om du har glömt en dos och kommer på det inom 12 timmar från när du vanligtvis tar dosen, ska du ta den så snart du ihåg det.

- Om mer än 12 timmar har förflutit sedan du skulle ha använt Saxenda ska du emellertid hoppa över den missade dosen och injicera nästa dos följande dag vid den vanliga tidpunkten.
- Ta inte dubbel eller ökad dos följande dag för att kompensera för den missade dosen.

#### **Om du slutar att använda Saxenda**

Sluta inte att använda Saxenda utan att först tala med läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

#### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

##### **Allvarliga biverkningar**

Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi) har i sällsynta fall rapporterats hos patienter som använt Saxenda. Du ska omedelbart uppsöka läkare om du får symtom som andningssvårigheter, svullnad av ansikte och svalg och hjärtklappning.

Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) är en mindre vanlig biverkning som rapporterats hos patienter som använt Saxenda. Pankreatit är ett allvarligt och möjligt livshotande sjukdomstillstånd.

Sluta ta Saxenda och kontakta läkare omedelbart om du får någon av följande allvarliga biverkningar:

- Svår och ihållande smärta i buken (magen) som kan stråla ut mot ryggen samt illamående och kräkningar, eftersom det kan vara tecken på en inflammerad bukspottkörtel (pankreatit).

##### **Andra biverkningar**

**Mycket vanliga:** kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

- illamående, kräkningar, diarré, förstoppning – dessa försvinner oftast efter några dagar eller veckor.

**Vanliga:** kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

- problem som påverkar magen och tarmarna som: matsmältningsbesvär (dyspepsi), magkatarr (gastrit), magbesvär, smärta i övre delen av magen, halsbränna, känsla av uppblåsthet, gaser i magen (flatulens), rapningar, muntorrhet • svaghetskänsla och trötthet
- förändrad smak
- yrsel
- svårt att sova. Detta inträffar oftast under de första 3 månaderna av behandlingen
- gallsten
- reaktioner på injektionsstället (blåmärken, smärta, irritation, klåda och utslag)
- lågt blodsocker (hypoglykemi). Varningssignaler på lågt blodsocker kan komma plötsligt och yttra sig som: kallsvett, kall och blek hud, huvudvärk, hjärtklappning, illamående, stark hungerkänsla, synförändringar, sömnhet, svaghet, nervositet, oro, förvirring, koncentrationssvårigheter och skakningar (tremor). Läkaren talar om hur du ska behandla lågt blodsocker och vad du ska göra om du upptäcker något av varningstecknen.

**Mindre vanliga:** kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

- vätskeförlust (uttorkning). Detta inträffar sannolikt vid behandlingens början och kan orsakas av kräkningar, illamående och diarré • inflammerad gallblåsa
- allergiska reaktioner inklusive hudutslag • allmän sjukdomskänsla
- snabbare puls.

**Sällsynta:** kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

- nedsatt njurfunktion
- akut njursvikt. Symtom kan vara minskad urinvolym, metallsmak i munnen och lätt att få blåmärken.

### Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via [det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V](#). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

## 5. Hur Saxenda ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionsspennans etikett och kartong efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

### Före första användningen:

Förvaras i kylskåp (2°C till 8°C). Får ej frysas. Förvaras inte nära frysfacket.

### När du har börjat använda injektionsspennan:

Injektionsspennan kan förvaras i 1 månad vid högst 30°C eller i kylskåp (2°C–8°C). Får ej frysas. Förvaras inte nära frysfacket.

När injektionsspennan inte används ska den förvaras med pennhuvens påsatt. Ljuskänsligt.

Får endast användas om lösningen är klar och färglös eller nästan färglös.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är liraglutid. En ml av injektionslösningen innehåller 6 mg liraglutid. En förfylld injektionspenna innehåller 18 mg liraglutid.
- Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyra och natriumhydroxid (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

### Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Saxenda levereras som en klar, färglös eller nästan färglös, injektionslösning i en förfylld injektionspenna. Varje injektionspenna innehåller 3 ml lösning och kan ge doser på 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg och 3,0 mg.

Saxenda finns i förpackningsstorlekar om 1, 3 eller 5 pennor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Injektionsnålar medföljer inte.

**Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

Novo Nordisk A/S Novo

Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

**Denna bipacksedel ändrades senast Övriga informationskällor**

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats <http://www.ema.europa.eu/>.

**Bruksanvisning för Saxenda 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna**

**Läs nedanstående instruktioner noga** innan du använder Saxenda förfylld injektionspenna.

**Innan du använder injektionspennan måste du få utbildning** av en läkare eller sjuksköterska.

Börja med att **kontrollera att injektionspennan innehåller Saxenda**

**6 mg/ml**. Titta därefter på bilderna nedan för att lära känna injektionspennans och injektionsnålens olika delar.


**Om du är blind eller har dålig syn och inte kan läsa dosräknaren på pennan ska du inte använda injektionspennan utan hjälp.** Ta hjälp av någon som har god syn och vet hur man använder Saxenda förfylld injektionspenna.

Injektionspennan är förfylld och försedd med dosväljare. Den innehåller 8 mg liraglutid och ger doser på 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg och 3,0 mg. Injektionspennan är utformad att användas med NovoFine eller NovoTwist engångsnålar upp till en längd av 8 mm och så tunna som ner till 32 G. Injektionsnålar medföljer inte i förpackningen.

**⚠ Viktig information**


Läs dessa upplysningar noggrant eftersom de är viktiga för att kunna använda injektionspennan på ett säkert sätt.

### Saxenda förfylld injektionspenna och injektionsnål (exempel)









#### 1 Förbered injektionspennan med en ny nål

- **Kontrollera namnet och den färgkodade etiketten** på injektionspennan för att vara säker på att det är Saxenda. Det är särskilt viktigt om du tar mer än en typ av injektionsläkemedel. Användning av fel läkemedel kan skada din hälsa.
- **Ta av pennans huv.**






<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kontrollera att lösningen i pennan är klar och färglös.</b> Titta i injektionspennans fönster. Om lösningen ser grumlig ut så ska du inte använda pennan.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ta en ny injektionsnål</b> och dra bort skyddspappret.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tryck in injektionsnålen rakt i pennan. Skruva tills den sitter fast.</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dra av det yttre nålskyddet och behåll det tills senare.</b> Du kommer att behöva det efter injektionen för att kunna ta bort injektionsnålen från pennan på ett säkert sätt.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dra av det inre nålskyddet och kasta det.</b> Om du försöker sätta tillbaka det så kan du råka sticka dig på injektionsnålen. En droppe lösning kan synas på nålspetsen. Detta är normalt, men du måste ändå kontrollera flödet första gången du använder en ny injektionspenna. <b>Vänta med att sätta i en ny nål</b> i injektionspennan tills du är redo att ta injektionen.</li> <li>△ <b>Använd alltid en ny injektionsnål vid varje injektion.</b> Detta för att förhindra tilltäppta injektionsnålar, kontaminering, infektion och feldosering. <b>Använd aldrig en böjd eller skadad injektionsnål.</b></li> </ul>	
<p><b>2 Kontrollera flödet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kontrollera flödet i varje ny penna före första injektionen.</b> Om din penna redan är i bruk, gå till steg 3 ”Välja dos”.</li> <li>• Vrid dosväljaren tills dosräknaren visar symbolen för flödeskontroll ( ).</li> </ul>	

- Håll pennan så att injektionsnålen pekar uppåt.  
**Håll doseringsknappen intryckt** tills dosräknaren står på 0. Nollan måste vara i linje med dosstrecket.  
En droppe lösning ska synas på nålspetsen.

En liten droppe kan finnas kvar på nålspetsen men den injiceras inte.  
**Om ingen droppe syns**, upprepa steg 2 "Kontrollera flödet" upp till 6 gånger. Om det fortfarande inte syns någon droppe ska du byta injektionsnål och upprepa steg 2 "Kontrollera flödet" en gång till. **Om det fortfarande inte syns någon droppe** ska du kassera pennan och använda en ny.

- △ **Se till att det alltid syns en droppe** på nålspetsen innan du använder en ny penna för första gången. Då kan du vara säker på att lösningen har ett flöde.  
Om det inte syns någon droppe kommer du **inte att injicera** något läkemedel även om dosräknaren rör sig. **Det kan vara ett tecken på att injektionsnålen är tilltäppt eller skadad.**  
Om du inte kontrollerar flödet varje gång du injicerar med en ny penna för första gången finns det risk för att du inte får den ordinerade dosen och att den avsedda effekten av Saxenda uteblir.



### 3 Välj dos

- **Vrid på dosväljaren tills dosräknaren visar din dos (0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg eller 3,0 mg).**  
Om du väljer fel dos kan du vrida dosväljaren framåt eller bakåt för att få rätt dos.  
Du kan ställa in pennan på maximalt 3,0 mg.

Du ändrar dosen med hjälp av dosväljaren. Det är bara dosräknaren och dosstrecket som visar hur många mg du väljer per dos.  
Du kan välja upp till 3,0 mg per dos. När pennan innehåller mindre än 3,0 mg stannar dosräknaren innan 3,0 visas.  
Dosväljaren klickar på olika sätt när du vrider den framåt, bakåt eller förbi det antal mg som finns kvar. Räkna inte pennans klickljud.






- △ **Använd alltid dosräknaren och dosstrecket för att se hur många mg du har valt innan du injicerar detta läkemedel.**  
Räkna inte pennans klickljud.  
Använd inte pennans skala. Den visar bara ungefär hur mycket lösning som finns kvar i pennan.  
**Endast doser om 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg eller 3,0 mg får väljas med dosväljaren.** Den valda dosen måste stå exakt mitt för dosstrecket för att du säkert ska få korrekt dos.








### Hur mycket lösning finns det kvar?

- **Injektionspennans skala** visar **ungefär** hur mycket lösning som finns kvar i pennan.



<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Om du vill se exakt hur mycket lösning som finns kvar</b> ska du använda dosräknaren: Vrid dosväljaren tills <b>dosräknaren stannar</b>. Om den visar 3.0, finns det <b>minst 3,0 mg</b> kvar i pennan. Om <b>dosräknaren stannar innan 3,0 mg</b> finns det inte tillräckligt med lösning kvar i pennan för en hel dos om 3,0 mg.</li> </ul> <p><b>Om du behöver mer läkemedel än vad som finns kvar i pennan</b> Du får dela dosen mellan din nuvarande penna och en ny penna, men endast om en läkare eller sjuksköterska har utbildat dig eller talat om för dig att du får göra det. Använd en miniräknare för att räkna ut doserna enligt anvisningar från läkare eller sjuksköterska.</p> <p>△ <b>Var mycket noga med att räkna rätt.</b> Om du inte är säker på hur du ska dela dosen mellan två pennor ska du injicera hela dosen med en ny penna.</p>	 <p><b>B</b></p> <p>Exempel Dosräknare stannar: 2,4 mg kvar</p> 
<p><b>4 Injicera dosen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>För in injektionsnålen i huden</b> så som läkaren eller sjuksköterskan har visat dig.</li> <li>• <b>Kontrollera att du kan se dosräknaren.</b> Täck inte över dosräknaren med fingrarna. Detta kan avbryta injektionen.</li> </ul>	 <p><b>A</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tryck ner doseringsknappen och håll den intryckt tills dosräknaren visar 0.</b> Nollan måste vara i linje med dosstrecket. Därefter kan du höra eller känna ett klick.</li> </ul>	 <p><b>B</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Håll kvar nålen i huden när dosräknaren har kommit till 0 och räkna sakta till 6.</b></li> <li>• Om du tar bort nålen tidigare så kan det hända att det kommer ut en stråle av lösningen från nålspetsen. Om detta händer har du inte fått hela dosen.</li> </ul>	 <p><b>C Räkna sakta:</b> 1-2-3-4-5-6</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ta bort injektionsnålen från huden.</b> Om det sipprar ut blod vid injektionsstället, tryck lite lätt. Gnugga inte området.</li> </ul> <p>Det kan synas en droppe lösning vid nålspetsen efter injektionen. Det är normalt och har ingen inverkan på dosen.</p> <p>△ <b>Håll alltid ett öga på dosräknaren för att se hur många mg du injicerar.</b> Håll doseringsknappen intryckt tills dosräknaren står på 0. <b>Så här märker du om injektionsnålen är tilltäppt eller skadad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Om siffran 0 inte visas på dosräknaren när du har tryckt kontinuerligt på dosknappen så kan det hända att du använder en</li> </ul>	
<p>nål som är tilltäppt eller skadad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I sådana fall har du <b>inte</b> fått något läkemedel alls, trots att dosräknaren har rört sig från den dos du ställde in från början.</li> </ul> <p><b>Så här gör du om injektionsnålen är tilltäppt.</b> Byt nålen enligt anvisningarna i steg 5 ”Efter injektionen”. Upprepa sedan alla anvisningar från och med steg 1 ”Förbered injektionsspennan med en ny nål”. Se till att du väljer hela den dos du behöver.</p> <p><b>Vidrör aldrig dosräknaren under injektionen.</b> Det kan avbryta injektionen.</p>	
<p><b>5 Efter injektionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>För in nålspetsen i det yttre nålskyddet</b> på en plan yta utan att röra vid injektionsnålen eller det yttre nålskyddet.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• När injektionsnålen är täckt <b>trycker du försiktigt fast det yttre nålskyddet helt och hållet.</b></li> <li>• <b>Skruva bort injektionsnålen</b> och kassera den på ett säkert sätt.</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sätt tillbaka pennhuven</b> på penna efter varje användning för att skydda lösningen mot ljus.</li> </ul> <p><b>Kassera alltid injektionsnålen efter varje injektion</b> för att slippa tilltäppta injektionsnålar och göra injektionerna mer bekväma. Om injektionsnålen är tilltäppt kommer du <b>inte</b> att injicera något läkemedel. När penna är tom ska du kassera den <b>utan</b> injektionsnål, enligt anvisningar från läkare, sjuksköterska, apotekspersonal eller lokala myndigheter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>△ <b>Försök aldrig sätta tillbaka det inre nålskyddet på injektionsnålen.</b> Du kan sticka dig på injektionsnålen.</li> <li>△ <b>Ta alltid bort injektionsnålen från penna efter varje injektion.</b> Detta kan förhindra tilltäppta injektionsnålar, kontaminering, infektion, läckage av lösningen och feldosering.</li> </ul>	
<p><b>Ytterligare viktig information</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Du bör alltid förvara penna och injektionsnålarna <b>utom syn- och räckhåll för andra</b>, särskilt barn.</li> <li>• <b>Dela aldrig</b> din penna eller dina injektionsnålar med någon annan.</li> <li>• Vårdgivare <b>måste vara mycket försiktiga vid hantering av använda injektionsnålar</b> för att förhindra stickskador och korsinfektion.</li> </ul>	
<p><b>Ta hand om din penna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lämna inte penna i bilen</b> eller på någon annan plats där den kan bli för varm eller för kall.</li> <li>• <b>Injicera inte Saxenda som varit frusen.</b> Om du gör det finns det risk för läkemedlet inte ger avsedd effekt.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Utsätt inte penna för damm, smuts eller vätska.</b></li> <li>• <b>Du får inte tvätta, blötlägga eller smörja penna.</b> Om det behövs kan du rengöra den med ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa.</li> <li>• <b>Se till att inte tappar penna</b> och låt den inte slås mot en hård yta. Om du tappar den eller misstänker något problem bör du sätta på en ny injektionsnål och kontrollera flödet innan du injicerar.</li> <li>• <b>Försök inte fylla penna på nytt.</b> När den är tom måste den kasseras.</li> <li>• <b>Försök inte att reparera penna</b> eller ta isär den.</li> </ul>	